



Ultracain®

Um alle Ihre Patienten individuell behandeln zu können, bieten wir Ihnen eine breite Auswahl Ultracain®-Lokalanästhetika in verschiedenen Darreichungsformen an.

Gemeinsam schreiben wir die Geschichte weiter

Ultracain® – weil jeder Patient besonders ist



Anästhesiedauer ^{1,2}



Ultracain® Dental 1:200.000

Wirksamkeit und Verträglichkeit ^{1,2}
Effektive Anästhesiedauer ca. 45 Minuten.

Wirkungseintritt ^{1,2}
Nach 1–3 Minuten.

Pharmakologische Eigenschaften ^{1,2}

- Schnelle Elimination aus dem Blut
- Proteinbindung = 95 %
- Halbwertszeit = 25 Minuten

Dosierung ^{1,2}

- Depot von 1 Ampulle (1,7 ml) pro Zahn
- Zur Nachinjektion: 1–1,7 ml

Maximaldosierung ^{1,2}
7 mg/kg Körpergewicht
Bei einer Konzentration von 40 mg Articain/ml entspricht dies bei 70 kg schweren Patienten einem Volumen von 12,25 ml (ca. 7 Zylinderampullen).

Darreichungsformen und Packungsgrößen ^{1,2}

Zylinderampullen zu 1,7 ml

Parabenzfrei

– Packung à 100 Zylinderampullen

Ampullen zu 2 ml

Parabenzfrei

– Packung à 12 Ampullen

Lagerung ^{1,2}

Nicht über 25 °C,
vor Licht schützen.



Anästhesiedauer ^{3,4}



Ultracain® Dental forte 1:100.000

Wirksamkeit und Verträglichkeit ^{3,4}
Effektive Anästhesiedauer bei chirurgischen Eingriffen ca. 75 Minuten.

Wirkungseintritt ^{3,4}
Nach 1–3 Minuten.

Pharmakologische Eigenschaften ^{3,4}

- Schnelle Elimination aus dem Blut
- Proteinbindung = 95 %
- Halbwertszeit = 25 Minuten

Dosierung ^{3,4}
Individuelle Dosierung, je nach chirurgischem Eingriff.

Maximaldosierung ^{3,4}
7 mg/kg Körpergewicht
Bei einer Konzentration von 40 mg Articain/ml entspricht dies bei 70 kg schweren Patienten einem Volumen von 12,25 ml (ca. 7 Zylinderampullen).

Darreichungsformen und Packungsgrößen ^{3,4}

Zylinderampullen zu 1,7 ml

Parabenzfrei

– Packung à 100 Zylinderampullen

Ampullen zu 2 ml

Parabenzfrei

– Packung à 12 Ampullen

Lagerung ^{3,4}

Nicht über 25 °C,
vor Licht schützen.



Ultracain Dental Ampullen, Ultracain Dental Zylinderampullen, Ultracain Dental forte Ampullen, Ultracain Dental forte Zylinderampullen

Qualitative u. quantitative Zusammensetzung: 1 ml Injektionslösung enth. 40 mg Articainhydrochlorid u. 0,006 mg/0,012 mg Epinephrinhydrochlorid entsprechend 0,005 mg/0,010 mg Epinephrin.

Sonstige Bestandteile: Natriummetabisulfit (E 223), Natriumchlorid, Wasser f. Injektionszwecke, Salzsäure, Natriumhydroxid. **Anwendungsgebiete:** Routineeingriffe, wie komplikationslose Einzel- u. Reihenextraktionen, Kavitäten- u. Kronenstumpfpräparationen. **Gegenanzeigen:** Überempf. geg. Articainhydrochlorid, Epinephrinhydrochlorid o. e. d. sonst. Bestandteile (insbes. a. Sulfite); Überempf. geg. and. Lokalanästhetika v. Amidtyp (außer eine Articain-Überempfindlichkeit wurde durch entspr. Testmethoden eindeutig ausgeschlossen); schwere Störungen d. Reizbildungs- o. Reizleitungssystems (z. B. hochgradige Bradykardie, AV-Block II. u. III. Grades); akute dekompensierte Herzinsuffizienz (akute kongestive Herzinsuffizienz); schwere Hypotonie; schwere Hypertonie; paroxysmale Tachykardie; hochfrequente absolute Arrhythmie; innerhalb der letzten 3 bis 6 Monate aufgetretener Herzinfarkt; Koronararterien-Bypass-Chirurgie innerhalb d. letzten 3 Monate; Phäochromozytom; Engwinkelglaukom; bei gleichzeitiger Anwendung v. nicht kardioselektiven Betablockern (z. B. Propranolol, da e. durch d.

Epinephrin-Gehalt zu e. hypertensiven Krise u. schwerer Bradykardie kommen kann); gleichzeitige Behandlung mit trizyklischen Antidepressiva o. MAO-Hemmern, da d. Wirkstoffe d. Herz-Kreislauf-Wirkungen d. Epinephrins verstärken können. Das kann bis zu 14 Tage nach Beendigung e. Behandlung mit MAO-Hemmern zutreffen; Anästhesien im Endstrombereich (insbesondere von Fingern, Zehen, Penis und Nasenspitze); Hyperthyreose; intravasale Injektion; Patienten mit unzureichend behandelter Epilepsie. Ultracain Dental u. Ultracain Dental forte enthalten Natriummetabisulfit (E 223) u. dürfen daher nicht bei Bronchialasthmatikern und bei Personen mit Sulfitüberempfindlichkeit angewendet werden, da akute allergische Reaktionen mit anaphylaktischen Symptomen, wie Bronchialspasmus, auslöst werden können. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Lokalanästhetikum, Articain, Kombinationen, ATC-Code: N01BB58. **Inhaber der Zulassung:** Septodont GmbH, Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel, Deutschland. **Abgabe:** Rezept- und apothekenpflichtig. **Stand der Information:** März 2022.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Fachinformationen von Ultracain Dental Ampullen, Ultracain Dental Zylinderampullen, Ultracain Dental forte Ampullen oder Ultracain Dental forte Zylinderampullen.

1. Fachinformation Ultracain® Dental Zylinderampullen. Stand März 2022. 2. Fachinformation Ultracain® Dental Ampullen. Stand März 2022. 3. Fachinformation Ultracain® Dental forte Zylinderampullen. Stand März 2022. 4. Fachinformation Ultracain® Dental forte Ampullen. Stand März 2022.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ultracain.at

Kontakt: info@ultracain.at

Ultracain® ist über Ihre Apotheke zu beziehen. Es gelten die Konditionen der jeweiligen Apotheke.

Septodont GmbH · Felix-Wankel-Str. 9 · 53859 Niederkassel, Deutschland · Tel.: +49 (0) 228 971 26-0 · Fax: +49 (0) 228 971 26-66